МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

САМАРА АРИС

ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ
В СФЕРЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
КООПЕРАЦИИ
И ПОДДЕРЖКИ ФЕРМЕРОВ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Земляника садовая

САМАРА 2023

Содержание

Значение культуры 1

Сорта земляники 1

Технология выращивания в открытом грунте 3

Технология выращивания в закрытом грунте 9

Список информационных источников 12

Земляника садовая

Составитель: В. Черников, ведущий профконсультант МИКЦ «Большеглушицкий» ГБУ ДПО «Самара – АРИС»

Фото: pixabay.com

Значение культуры

Земляника является одной из первых ягод, которыми пользовалось человечество с доисторических времен.

Земляника – очень ценный продукт питания. В 100 г свежих ягод содержится в среднем 6–9 г сахара, 0,6–1,2 г органических кислот, 50–70 мг (85% – здесь и далее в скобках указана доля суточной потребности человека) витамина С, 2–8 мг (2–8%) йода, 250–700 мг Р-активных веществ (катехины, антоцианы, флавоны и др.), 6 мг щавелевой кислоты, 5 мг азотистых пуриновых соединений, 40 мг (5%) кальция, 18–28 мг натрия, 126–160 мг (4%) калия, 18 мг (5%) магния, 23 мг (2%) фосфора, 1,2 мг (9%) железа (одно из первых мест среди плодов и ягод), 32 мг S03, 14 мг Cl, 0,03 мг витамина В1, 0,2–0,4 мг фолиевой кислоты (витамина В9), 0,5 мг (3%) рибофлавина (витамина В2), 0,30 мг (2%) витамина РР; растворимых в жире витаминов – 0,03–0,04 мг (меньше 1%) каротина, 0,03 мг (2%) В1, 0,1 мг филлохинона (витамина К); 0,02 г поваренной соли, микроэлементы (марганец, кобальт, йод).

Земляника рано созревает и является первой ягодой в сезоне после зимнего перерыва. Обладая высокой урожайностью, достигающей 10–14 т с 1 га, культура земляники весьма доходна и быстро окупает затраты на закладку плантаций и уход за ними.

Легкая размножаемость путем отпрысков – усов – составляет очень ценное свойство земляники. Достаточно сказать, что один гектар плодоносящей плантации может дать рассады на 4–5 га новых посадок, а с гектара маточных плантаций – на 6–8 га.

Ягоды земляники используются не только в свежем виде, но и имеют широкое применение как сырье для пищевой промышленности, для приготовления варенья, сиропов, соков и т. п.

Сорта земляники

Зенга Зенгана

Земляника этого сорта имеет высокие компактные кусты. В высоту они достигают 40 см. На кусте мало розеток. Ягоды часто касаются земли. Чтобы они были чистыми, стоит выполнять мульчирование.

У ягод Зенга Зенгана разная форма. Ягоды не имеют шейку. Кожица может иметь как бордовый, так и ярко-красный цвет. Вкус плодов

очень сладкий. Есть небольшая кислинка. У переспевшей ягоды вкус малины.

Землянка созревает в середине лета. Данный сорт – среднеспелый. Ягода может быть в весе до 35 г, если соблюдаются правила агротехники.

С куста можно снимать до 2,5 килограмма ягод. Листья у растения небольшие. У них правильная форма и острые края. Зенгана считается зимостойким сортом. Растение выдерживает понижение температуры до –25 градусов.

Ред Гонтлет

Растение этого сорта в форме компактного кустарника, вырастающего до размеров 20х20 см. Характеризуется среднерослый клубничный куст с прямостоячими сильными стеблями и умеренной облиственностью светло-зелеными листьями среднего размера. Цветоносы у растения утолщенные и длинные, часто выделяющиеся над листовой розеткой. В период вегетации на цветоносах появляется множество белоснежных цветков, собранных в пышные соцветия. Особенностью разновидности являются высокие адаптивные качества и невероятный вкус. Помимо того, данный вид характеризуется повторным цветением и плодоношением.

Культура относится к классу ягод со среднепоздними сроками созревания. Вызревают ягоды в конце июня – начале июля. Длится плодоношение 6–8 недель.

Сорт заявлен как высокоурожайный. В среднем с 1 куста собирают до 800 г плодов. Обеспечив культуре правильный уход, с одной сотки можно получить до 100 кг сочной ягоды.

Фестивальная

Куст растения высокий, компактный. Цветоносы толстые, расположены на уровне листьев или ниже.

Соцветия земляники садовой Фестивальная малораскидистые. Ягоды крупные, первого сбора вплоть до 35 г, средняя масса – 10 г, овальной формы, с короткой широкой шейкой.

Кожица окрашена в ярко-красный цвет, блестящая. Семянки темно-красные, слабо вдавлены в мякоть, расположены почти поверхностно. Мякоть красная, плотная, сочная, имеет хороший вкус. Применение – универсальное.

Сорт среднего срока созревания. Отличается высокой урожайностью. Болезнями поражается в средней степени.

Технология выращивания в открытом грунте

Высадку земляники в открытую почву можно производить на протяжении всего периода вегетации. Однако опытные садоводы советуют это делать в начале осеннего либо весеннего периода, или в последние летние недели. В том случае, если посадкой земляники заняться в последние дни августа либо первые сентября, кустики успеют очень хорошо укорениться до первых морозов и в следующем сезоне начнут плодоносить. В регионах с очень холодными и малоснежными зимами высадкой такой культуры рекомендуется заняться в весеннее время, сразу после того, как прогреется грунт.

Подходящий для такого растения участок должен быть хорошо освещенным. Нельзя производить высадку земляники на тех участках, где до этого росли капуста, картошка либо огурцы. Также для выращивания данной культуры не подходят участки, где в прошлом году выращивался перец, помидоры, баклажаны и иные представители пасленовых. Не рекомендуется высаживать землянику по соседству с малиной.

Грунт для посадки земляники подойдет практически любой. Если обеспечить ей правильный уход, то расти данное растение сможет на любой почве, однако чрезмерно сухой песчаный грунт и болотистый участок для такой культуры не подходят. Лучше всего земляника будет расти на слабокислой супесчаной либо легкосуглинистой почве, при этом она должна быть плодородной, влажной и хорошо пропускающей воздух. Для посадки не следует выбирать участки, где наблюдается застаивание талой либо дождевой воды. Также рекомендуется, чтобы грунтовые воды залегали глубже, чем 0,7–0,8 м. Кислотность почвы должна быть 4,5–5,5. Опытные садоводы рекомендуют выбирать под посадку земляники те участки, где до этого выращивались бобовые, лук, чеснок, бархатцы, люпин, овес, рожь, горох, свекла, морковь, редис, редька, петрушка и укроп. Если же на участке росли огурцы, крестоцветные либо пасленовые, то он для посадки данной культуры не подойдет.

Если посадка земляники запланирована на весну, то подготовить участок для нее нужно будет еще в осеннее время. Для этого надо произвести перекопку участка вилами на глубину 0,25–0,3 м, при этом следует удалить из земли все корни сорной травы, а также внести в нее 5 кг торфа, компоста либо перепревшего навоза из расчета на 1 квадратный метр. Также в грунт следует внести полное минеральное удобрение, так, на 1 квадратный метр участка берется 20 г сернокислого калия, 40 г двойного суперфосфата и 5 кг древесной золы. Если высадка земляники планируется весной, то вносить в почву органические удобрения следует в осеннее время, а минеральные – весной. В том случае, если грунт на участке богат питательными веществами, то внесение в него удобрений не понадобится.

Высадка производится по схеме 20х30 сантиметров, при этом между рядами следует оставлять от 0,7 до 0,8 м. При помощи тяпки необходимо сделать луночки, при этом их глубина должна быть от 0,25 до 0,3 м, а ширина примерно 0,2 м. В каждую готовую лунку надо вылить по 1 л воды, и не дожидаясь пока она впитается, поместить в нее кустик. Затем лунка заполняется почвой, которая немного уплотняется. Корневая шейка кустика должна находиться на одном уровне с участком, но при этом нужно обязательно проследить, чтобы сердечко не было заглублено в землю, в противном случае земляника загниет

и начнет преть. В том случае, если растение заглубить на небольшую глубину, это может привести к его гибели из-за подсыхания корневой системы. Когда земляника будет посажена, хорошенько прорыхлите поверхность грунта между рядами.

Если посадка растения производится в сухую почву, до того, как оно полностью приживется, ему понадобится еще 2 либо 3 полива. Поливать нужно каждодневно в вечернее время. Помимо этого, первые дни после посадки кустики будут нуждаться в защите от прямых лучей солнца.

Если вы решили заняться посадкой в осеннее время, то подготовкой участка под данную культуру следует заняться за 15–20 суток. Подготавливают участок точно так же, как и в весеннее время, разница лишь в том, что в почву сразу вносятся и минеральные, и органические удобрения. Опытные садоводы в этом случае рекомендуют взять половинную дозу минеральных удобрений. Высадку кустиков производят точно так же, как и в весеннее время. Когда земляника приживется на новом месте, поверхность почвы между рядами необходимо засыпать перепревшей соломой либо навозом, при этом толщина слоя может варьироваться от 8 до 10 сантиметров. В этом случае корневая система земляники будет защищена от зимних морозов.

Чтобы вырастить землянику в открытой почве, ее следует своевременно пропалывать, рыхлить поверхность почвы между рядами, окучивать, поливать, подкармливать, обрезать, обрабатывать в целях профилактики либо лечения разнообразных заболеваний и вредителей, а еще подготавливать участок к предстоящей зиме. В некоторых случаях посаженная в прошлом году земляника в зимнее время выталкивается из грунта сильными морозами, в связи с этим в весеннее время нужно будет присыпать корешки почвой, которую немного притаптывают, и сделать это следует при первой же возможности. После этого рекомендуется прорыхлить поверхность грунта между рядами и около кустиков. Удалять сорную траву нужно сразу же после ее появления, а если на поверхности грунта образовалась корка, то ее следует прорыхлить. На протяжении всего периода вегетации прорыхлить поверхность почвы между рядами следует около 7 либо 8 раз, а около кустов – не меньше 5 раз. Чтобы значительно упростить уход за данной садовой культурой, поверхность участка надо засыпать слоем мульчи

(опавшей с деревьев листвой, перепревшей соломой, камышом либо торфом). Благодаря мульчированию корка на почве не появляется, а также заметно сокращается количество сорняков. Если растение выращивается на одном и том же месте более 5 лет, то специалисты рекомендуют обязательно пересадить его на новое место.

Землянику нужно поливать своевременно и правильно, потому что она относится к числу влаголюбивых растений. Лучше всего ее поливать искусственным дождеванием. Еще некоторые садоводы делают достаточно глубокие (примерно 12 сантиметров) борозды по центру междурядий. Затем в данные борозды нужно вылить воды. Когда жидкость впитается в почву, бороздки следует заделать, а также нужно разрыхлить поверхность участка. В том случае, когда полив производится из лейки, рассекатель необходимо убрать, а затем нужно аккуратно вылить воду непосредственно под корни растения, при этом постарайтесь, чтобы жидкость не оказалась на поверхности листвы. Температура воды, используемой для полива, и температура воздуха должны быть одинаковыми. Замечено, что если воду пропустить через магнит, то это будет способствовать увеличению количества и величины плодов.

Для того, чтобы понять, нуждается ли растение в поливе, необходимо произвести проверку влажности почвы на глубине 0,2–0,3 м. Землянику нужно полить в том случае, если грунт на данной глубине будет рассыпаться в руках. Во время интенсивного роста кусты, как правило, поливают 1 раз в 1–1,5 недели. В период наливания плодов полив следует производить с частотой 1 раз в 5 суток. Во время дождей частота поливов полностью зависит от состояния почвы.

Пересаживать кустики земляники рекомендуется не реже 1 раза в 4–5 лет. Если выращивается ремонтантная земляника, то ее пересадку следует производить 1 раз в 2 года. Пересадку рекомендуется проводить в осеннее время, а точнее, в сентябре. При пересадке порядок действий должен быть точно таким же, что и при первичной посадке. Кустики надо поместить в подготовленные луночки, которые заполняются землей, при этом проследите за тем, чтобы сердечки возвышались над уровнем поверхности участка. Поверхность почвы между рядами перед морозами надо засыпать слоем мульчи, что позволит защитить корневую систему растения от вымерзания.

После того как кусты перестают плодоносить, у них наблюдается отрастание усов. В этот период растения нужно прополоть, полить, а также разрыхлить грунт вокруг кустиков. Выберите две одно- либо двухлетние розетки, которые должны быть абсолютно здоровы и располагаться максимально близко к родительскому растению. Их нужно немного вдавить в землю, а затем присыпать рыхлой почвой, при этом сердечко не должно быть засыпано. Подождите, пока усы дадут корни. В сентябре нужно извлечь из земли укоренившиеся усы и посадить их на новое постоянное место. Некоторые садоводы отделяют усы и высаживают на разводочные грядки для доращивания. При этом над грядкой необходимо сделать навес из лутрасила, который защитит растения от палящих лучей солнца. Также следует учесть, что на тех усах, которые имеют корни, следует оставить 3 либо 4 листовые пластины, а на розетках без корешков – всего 2 листочка, в этом случае практически все силы растеньица будут направлены на наращивание корневой системы. Навес следует убрать спустя полмесяца после посадки усов на грядку. В сентябре хорошо укоренившиеся усы следует высадить на постоянное место, при этом берут их вместе с земляным комом.

Размножение безусых сортов земляники еще производят делением куста (партикуляцией). Данную процедуру проводят в весеннее время либо когда закончится плодоношение. Выкопайте развитые, мощные кустики, освободите их корневую систему от почвы. Затем острым ножом разделите куст на несколько частей, при этом надо учесть, что у каждой части должен быть рожок, не меньше 3 листовых пластин и здоровые корешки белого окраса. Потемневшие старые корешки необходимо подрезать. Затем производят высадку частей на постоянное место.

Срезать листочки нужно у самой поверхности почвы. В этом случае патогенные микроорганизмы и вредители не смогут поселиться в их остатках. Срезанные розетки и листву можно использовать для заполнения компостной ямы. Однако если на них имеются вредные насекомые либо признаки болезни, то такие растительные отходы лучше уничтожить.

В том случае, если кустикам обеспечен правильный уход, и они абсолютно здоровы, то частая обрезка им не понадобится. В этом случае

данную процедуру рекомендуется проводить 1 раз в 2 либо 3 года. Также следует учесть, что обрезка молоденьким растениям может лишь навредить, так как она сильно ослабляет их.

Когда кусты будут обрезаны, им понадобится профилактическая обработка фунгицидными и инсектицидными препаратами. Когда начнет активно расти молодая листва, то землянику нужно будет своевременно поливать, полоть, подкармливать органикой и минеральными удобрениями, а еще рыхлить поверхность участка.

В регионах с холодными зимами поздней осенью до первых заморозков участок с земляникой необходимо укрыть сплошным слоем мульчи (облетевшей листвой либо соломистым навозом), при этом его толщина должна быть от 5 до 7 сантиметров. В этом случае кустики не вымерзнут, даже если зимний период будет очень холодным и малоснежным.

Чтобы уберечь растения от различных заболеваний и вредителей, достаточно систематически производить профилактические обработки. Опрыскивать растения нужно в начале весеннего периода и осенью. Перед весенней обработкой участок нужно очистить от прошлогодней мульчи, а также надо удалить и уничтожить всю старую листву. Для обработки нужно использовать те средства, которые в своем составе содержат медь, например, бордоскую жидкость, ХОМ либо Хорус. Второй раз растения в целях профилактики опрыскивают перед тем, как они зацветут, потом во время интенсивного роста листьев, затем 1 либо 2 раза с интервалом в полмесяца по окончанию цветения. Чтобы уничтожить возбудителей болезней, землянику обрабатывают Квадрисом, Топсином М, Фундазолом либо иным фунгицидом схожего действия. В профилактических целях от вредителей растение опрыскивают Энвидором, Актелликом, Калипсо либо схожими по действию препаратами. На частоту профилактических обработок значительное влияние оказывает инфекционный фон участка. Чем фон ниже, тем меньшее количество опрыскиваний потребуется, и наоборот.

Технология выращивания в закрытом грунте

При наличии отапливаемой теплицы сначала в ней устанавливают и поддерживают температуру +7°С, перед наступлением весны обогрев делают более интенсивным, но так, чтобы не превысить 12–14°С. В противном случае растения могут не зацвести. Как только начнется цветение большей части растений, температурный режим начинают поддерживать в диапазоне +20+28°С.

Технология выращивания близка к открытой, но имеет свои особенности. Грунт для высадки необходимо подготовить заранее. Если за год удобрить землю торфом и перегноем, а непосредственно перед высадкой добавить в нее минеральные удобрения (азотные, фосфорные и калийные) – можно рассчитывать на хороший урожай и продолжительное плодоношение.

Рассаду высаживают в обычные грядки. Существует несколько вариантов передовой агротехники:

– **поднятые грядки.** В деревянные короба послойно засыпают компоненты грунта, такие, как органические удобрения, щепа,

минеральные подкормки. Эти слои перемежаются слоями грунта. Растения постепенно получают те или иные питательные вещества по мере роста корневой системы. Данная агротехника сложнее при формировании грядки, но существенно экономит время по уходу за растениями;

– **подвесные грядки.** Контейнеры с горшочками рассады расставляются на узких полках или подвешиваются к каркасу теплицы в несколько ярусов. Такая технология позволяет полнее использовать освещение и в несколько раз увеличить полезную площадь теплицы. Это особенно важно при зимнем выращивании культуры и позволяет существенно снизить расходы на отопление в пересчете на килограмм урожая.

При тепличной культивации земляники важно следить за режимом полива и вентиляции. Повышенная влажность может погубить как рассаду, так и взрослые растения.

При выращивании в легких парниках на случай заморозков запасают укрывные материалы. Для этого хорошо подходят легкие нетканые полотна. Ими в случае заморозков укутывают посадки в несколько слоев. В случае сильного понижения температуры в теплице ставят электрические или газовые обогреватели, или заносят жаровни. Кроме низкой температуры, заморозки приводят и повышению влажности, поэтому парник необходимо регулярно вентилировать.

Нельзя допускать пересыхания почвы – растение может и не оправиться. Не менее вредна другая крайность: избыточный полив ведет к росту влажности. В таких условиях могут развиться заболевания растения. Кроме того, при переувлажнении ягоды получаются водянистыми, не накапливают сладости и имеют слабый аромат. Поливают культуру только под корень, так, чтобы капли воды не орошали листья и соцветия.

При постоянном выращивании растений жизнетворная сила почвы истощается. Поэтому необходимо восполнять содержание в грунте минеральных веществ. Подкормка минералами проходит два раза в месяц. В ведре воды разводят 10 г хлористого калия и 80 г аммиачной селитры. Тщательно перемешивают и поливают растения под корень, избегая попадания раствора на листья и цветы.

Для подкормки органическими удобрениями используют перепревший навоз или птичий помет. Навоз нужно развести 1 к 5, а более активный помет – 1 к 10. Вносить органику также нужно так, чтобы не задеть листья и соцветия.

В открытом грунте опыление проводится полезными насекомыми, собирающими нектар с цветов. Часть пыльцы переносится ветром. В закрытом объеме, а тем более в зимний период, когда насекомые впадают в спячку, опылять землянику приходится садоводу. Для этого используют несколько способов:

- **принудительная вентиляция.** Искусственный ветер создается направленными в разные стороны вентиляторами. В замкнутом объеме теплицы они создадут воздушные потоки, которые перенесут пыльцу от мужских цветков к женским. Для обычных сортов достаточно устраивать ветер в период цветения. Для ремонтантной земляники, которая цветет непрерывно, придется устраивать опыление несколько раз в неделю по 2–3 часа;
- **внести в теплицу улей с пчелами.** Эффективно только в весенне-летний период, пока пчелы не уснули;
- **обильно оросить цветы опрыскивателем.** При таком способе теряется до половины пыльцы, и некоторым цветкам ее может не хватить.

В период опыления нужно поддерживать температуру в диапазоне +15+25°С, чтобы сохранялась клейкость пыльцы. Если пренебречь искусственным опылением, большого урожая в теплице не получить.

Заболевания растений в теплице возникают, как правило, через зараженный грунт. Поэтому при подготовке его очень важно удалять полностью все остатки растений. Могут болезни земляники возникнуть и из-за нарушения условий содержания: повышенной влажности, недостаточного проветривания, нарушения температурного режима. При обнаружении признаков заболевания нужно немедленно удалить заболевшие стебли, листья и ягоды и сжечь их.

При выращивании земляники зимой особенно важно уделять внимание следующим моментам: стабильность температурного режима, своевременный, но не чрезмерный полив, своевременная подготовка посадочного материала и поддержание оборота растений.

Садовод должен внимательно следить за прогнозом погоды, особенно если в теплице предусмотрено автономное отопление, и своевременно повышать мощность отопительных устройств. При наличии возможности следует установить систему автоматического управления климатом.

Важно понимать, что при понижении температуры повышается влажность воздуха, а при достижении точки росы происходит выпадение конденсата на конструкции теплицы и растения. Система управления должна отслеживать и уровень влажности.

Зимой особенно важна своевременная и качественная вентиляция. Разумным будет оборудовать теплицу системой рекуперации. В ней выходящий из помещения теплый воздух будет подогревать поступающий в него холодный воздушный поток. При этом снизятся затраты на отопление и легче будет поддерживать оптимальный влажностный режим в теплице.

Список информационных источников

1. Хозяйственное значение земляники. [Электронный ресурс] // Клубника Frigo: сайт. URL: http://fri-go.ru/xozyajstvennoe-znachenie-zemlyaniki.html (дата обращения 31.10.2023).
2. Земляника. Хозяйственное значение. [Электронный ресурс] // Библиотека специализированной литературы: сайт. URL: https://www.spec-kniga.ru/rastenievodstvo/yagodnye-kultury/zemlyanika-hozyajstvennoe-znachenie.html (дата обращения 31.10.2023).
3. Огородные шпаргалки. Земляника Зенга Зенгана: описание сорта. Особенности и правила выращивания ягоды. [Электронный ресурс] // Дзен – платформа для создания и просмотра контента. URL: https://dzen.ru/a/Yji7lbg0ElNmxCNo (дата обращения 31.10.2023).
4. Земляника садовая Фестивальная. [Электронный ресурс] // LePlants.ru: сайт. URL: https://leplants.ru/fragaria-ananassa-festivalnaya/?ysclid=lock3zy8pm367924301 (дата обращения 31.10.2023).
5. Земляника. [Электронный ресурс] // Растениевод: сайт. URL: https://rastenievod.com/zemlyanika.html (дата обращения 31.10.2023).
6. Викторович А. Земляника в теплице: сорта, выращивание, зимние нюансы. [Электронный ресурс] // СтройПомощник.ру – строительный портал. URL: https://stroypomochnik.ru/zemlyanika-v-teplitse-01/?ysclid=locm5qn7s3100661263 (дата обращения 31.10.2023).

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САМАРА АРИС

ГБУ ДПО «Самара – АРИС» – единственная в регионе организация, оказывающая на регулярной основе информационно-консультационные и образовательные услуги сельхозтоваропроизводителям всех форм собственности, а также органам управления АПК районного уровня.

Основные виды услуг и работ:

- информационно-консультационные услуги в сфере АПК;
- образовательные услуги (в рамках дополнительного профобразования);
- организация и проведение семинаров, дней поля, совещаний, конференций, мастер-классов, бизнес-тренингов;
- разработка долгосрочных и краткосрочных программ развития агропредприятий;
- организация опытно-демонстрационных площадок на базе передовых, инновационно ориентированных агропредприятий и фермерских хозяйств;
- разработка бизнес-планов и технико-экономических обоснований;
- оформление пакета документов для участия в конкурсах на получение грантов для начинающих фермеров и владельцев семейных животноводческих ферм;
- помощь при подготовке необходимых документов для заключения договоров финансовой аренды (лизинга) с АО «Росагролизинг» на поставку сельскохозяйственной техники, оборудования и животных;
- мониторинг цен на основные виды сельскохозяйственной и продовольственной продукции;
- выпуск ежемесячного журнала «Агро-Информ»;
- информационная и техническая поддержка официального сайта Минсельхозпрода Самарской области и сопровождение собственного сайта;
- подготовка, тиражирование и распространение отраслевых баз данных, информационных изданий, научно-технологических фильмов;
- организационная и информационная поддержка региональных отраслевых союзов, ассоциаций и гильдий в региональном АПК.

Информационно-технологические ресурсы:

- ежемесячный журнал «Агро-Информ»;
- веб-сайты: mcx.samregion.ru и agro-inform.ru;
- видеостудия полного цикла;
- мини-типография.

Подразделения ГБУ ДПО «Самара – АРИС»

Отдел повышения квалификации кадров для АПК и сельскохозяйственного консультирования

446250, Безенчукский р-н, пгт Безенчук, ул. Тимирязева, 45
тел. (846-76) 2-38-92
e-mail: bezen-aris@yandex.ru

Отдел содействия развитию сельскохозяйственной кооперации

443109, г. Самара, ул. Металлургическая, 92
тел. (846) 207-95-60
e-mail: samara-aris@mail.ru

Отдел комплектования и планирования курсов

443532, Волжский р-н, п. Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, 18
тел. (846) 377-55-89
e-mail: ukkem-5@yandex.ru

Отдел реализации программ рабочих профессий

443109, г. Самара, ул. Металлургическая, 92
тел. 8-987-150-89-66
e-mail: tarasov.aris@mail.ru

Межрайонные информационно-консультационные центры (МИКЦ)

МИКЦ «Сызранский»
446026, г. Сызрань, ул. Володарского, 62а, к. 15
тел. (8464) 33-33-64
e-mail: mikc_zapad@mail.ru

МИКЦ «Большеглушицкий»
446180, с. Большая Глушица, ул. Пугачевская, 1
тел. (846-73) 2-40-99
e-mail: aris-73@yandex.ru

443109, г. Самара, ул. Металлургическая, 92
Тел. (846) 207-95-65
e-mail: samara-aris@mail.ru, сайт: agro-inform.ru